

AVES COMUNES COMMON BIRDS



Aves Comunes

1. *Aratinga mitrata* – Cotorra Mitrada. Tamaño: 38 cm. Cuerpo verde y cabeza color escarlata en la región ocular, la frente y el cuello. Patas de color marrón rosado. Se alimenta de semillas, frutos, bayas y flores. En algunas zonas es considerado una plaga por consumir maíz. Anida en las cavidades de los árboles.

2. *Basileuterus coronatus* – Reinita de Corona Rojiza. Tamaño: 13.5 – 14 cm. Ventralmente de color amarillo intenso y dorsalmente amarillo oliváceo. Cabeza y cuello grises y corona de color rufo naranja con dos líneas negras que se extienden de la frente a la nuca y otra hacia los lados de la cabeza. Es un ave insectívora que anida en estructuras cerradas o semi cerradas cerca del suelo.

3. *Rupornis magnirostris* – Gavilán Caminero. Tamaño: 33 – 40 cm. Cabeza gris cafeño pálido y dorso pardo grisáceo. Alas con la parte superior marrón y la inferior rojiza. Cola color entre café grisáceo y rufo con bandas negras y patas color amarillo. Come reptiles e insectos que por lo general se asolean en zonas abiertas. Anida sobre los árboles.

4. *Geotrygon frenata* – Paloma Perdiz de Garganta Blanca. Tamaño: 29.5 – 32 cm. Coloración general del plumaje es castaño grisáceo, frente castaña, corona de color gris pálido, garganta, pecho y vientre color gris pálido; nuca y dorso color castaño, las bandas de los malares del pico color negras y estrechas; patas rojizas. Estas aves son de hábitos diurnos y usualmente solitarios. Se alimenta de semillas y frutos caídos.

5. *Henicorhina leucophrys* – Cucarachero Montés de Pecho Gris. Tamaño: 11 cm. Ave de cola corta, espalda marrón, nuca y vientre castaños y pecho y panza gris. Cabeza negra con líneas negras hacia los lados y una línea blanca por encima del ojo. Come invertebrados que encuentra en lianas a niveles medio a bajo en la densa vegetación del sotobosque. Sus nidos son domos que los hacen según el lugar que habiten como zonas abiertas, vegetación densa o cavidades en los árboles.

6. *Merganetta armata* – Pato de los Torrentes. Tamaño: 40 cm. Es largo con el cuerpo delgado y el pico rojo. El macho tiene la cabeza blanca sin rayas negras con la garganta desnuda y el pecho blanco con líneas oscuras, la hembra tiene miembros inferiores de color naranja cuero. Dorso grisáceo a rojizo con rayas rojas, come invertebrados acuáticos como larvas de insectos y moluscos. Anida en rocas cercanas a los ríos.

7. *Momotus aequatorialis* – Relojero Andino. Tamaño: 41 cm. La cabeza tiene una corona negra rodeada de anillo turquesa, ojos rojos y máscara negra. El dorso es verde a marrón oliváceo. Pecho verde oliváceo a canela opaco y la cola tiene forma de raqueta con un pequeño espacio vacío en la mitad. Come insectos grandes, algunas veces vertebrados pequeños y raramente frutos. Anida en huecos hechos sobre el suelo o en riscos.

8. *Myadestes ralloides* – Solitario Andino. Tamaño: 16.5 – 18 cm. Dorsalmente marrón claro, cabeza con pico corto y corona gris. Lados de la cara gris y alas marrones con banda gris. Ventralmente gris plateado. Por lo general come frutos aunque complementa su dieta con insectos. Hace sus nidos en forma de taza probablemente sobre nidos o rocas.

9. *Myioborus miniatus* – Candelita Garganta Plomiza. Tamaño: 13.5 cm. Cabeza y partes superiores gris pizarra con el cuello de color gris negro. Con corona castaño. Pecho y partes ventrales amarillo. Cola negra con las plumas exteriores visiblemente blancas. Se encuentra en áreas boscosas, bordes y claros. Muy activos, se movilizan entre las ramas mostrando la característica de la cola blanca en vuelo, buscando insectos entre la vegetación y hojas muertas.

10. *Penelope montagnii* – Pava Andina. Tamaño: 60 cm. La cabeza es grisácea con finas rayas y el dorso marrón castaño opaco. Pecho de color grisáceo y patas rojo opacas. Se alimenta de frutos y anida en estructuras simples y abiertas en forma de taza sobre vegetación de tamaño bajo.

11. *Colaptes rubiginosus* – Carpintero Oliváceo. Tamaño: 23 cm. Cuerpo dorado olivo, con la cabeza, corona, mejilla y nuca roja en el macho, solo la hembra tiene la nuca roja, ambos con los lados de la cabeza color blanco. Frente gris acero, garganta barreteada de marrón oscuro y blanco, pecho y vientre barreteado de gris oscuro y amarillo tenue. Se alimenta de insectos los cuales busca en la corteza de los árboles y lianas a diferentes niveles. Anida en huecos de los árboles vivos o muertos.

12. *Psarocolius atrovirens* – Oropéndola Verde Oscuro. Tamaño: Macho 41 cm. – Hembras 43 cm. Coloración general verde olivo, tornándose acanelado en la rabadilla, cabeza mas clara que el cuerpo y con pico amarillo verdoso, cola de color amarillo punteada de verde olivo. Come en el dosel del bosque frutos y bayas. Anida en colonias de nidos gigantes.

13. *Thamnophilus caerulescens* – Batará Variable. Tamaño: 14.5 cm. Macho de color negro con manchas blancas en las alas y cola. La hembra es grisácea con vientre castaño y alas negruzcas. Se alimenta de diversos invertebrados, insectos y arañas que caza en niveles medios y altos de lianas y enmarañados, donde hace sus nidos en forma de taza.

14. *Tragodytes aedon* – Cucarachero Común. Tamaño: 11 – 12 cm. Los lados de la cabeza son de color café con moteado y listado café mas pálido. Dorso café con barreteado fino leve mas oscuro que las alas y la cola. Color barreteado negro en las alas y cola. Las patas son de color cuerno. Come insectos, arañas y otros invertebrados que busca en zonas abiertas. Anida en estructuras a manera de domo que las hace al intemperie o en cavidades.

15. *Vireo (olivaceus)* – Vireo de Ojo Rojo. Tamaño: 12 – 15 cm. Cuerpo gris oliváceo, garganta, pecho y vientre blancos, cabeza con corona gris y línea superciliar blanca con línea negra. Se alimenta de insectos y frutos según la temporada.

Common Birds

1. *Aratinga mitrata* – Mitred Parakeet. Size: 38 cm. Green body and head, scarlet in the eye region, forehead and neck. Brownish pink legs. Feeds on seeds, fruits, berries and flowers. In some areas is considered a pest for eating corn. Nests in tree cavities.

2. *Basileuterus coronatus* – Russet-crowned Warbler. Size: 13.5 – 14 cm. Bright yellow lower part, yellowish olive upper parts. Gray head and neck and gray color rufous orange crown by two black lines that extend from the front of the neck and another to the side of the head. Insectivorous bird that nests in enclosed or semi-enclosed structures near the ground.

3. *Rupornis magnirostris* – Roadside Hawk. Size: 33 to 40 cm. Light coffee brown head, grayish brown back. Brown top wing and reddish lower wings. Gray or brown rufous tail, with black stripes, yellow legs. Eats reptiles and insects that are out in open areas. Nests on trees.

4. *Geotrygon frenata* – White-throated Quail – Dove. Size: 29.5 – 32 cm. Overall plumage color is grayish brown, chestnut brown forehead, light gray crown, throat, chest and belly, brown neck and back, blacked narrow-striped beak; reddish legs. These birds are usually solitary and with daytime habits. Feeds on seeds and fallen fruits.

5. *Henicorhina leucophrys* – Gray-breasted Wood-Wren. Size: 11 cm. Bird with short tail, brown back, chestnut nape and upper parts, gray breast and belly. Black head with black sideways lines and a white line above the eye. Eats invertebrates found in medium to low dense semi-deciduous forests. Its nests are domes made according to its habitat such as open areas, dense vegetation or tree cavities.

6. *Merganetta armata* – Torrent Duck. Size: 40 cm. Long with slender body and red beak. Male head is white without black stripes, with nude throat and white breast with dark lines. Female, orange leather lower limbs. Grayish to red upper part with red stripes. Eats aquatic invertebrates such as insect larvae and shellfish. Nests on rocks near the rivers.

7. *Momotus aequatorialis* – Andean Motmot. Size: 41 cm. The head has a black crown encircled by turquoise ring, red eyes and black mask. The back is green to brown olivaceous. Green olivaceous to light cinnamon breast and the tail is shaped like a racket with a small empty space in the middle. Eats large insects, small vertebrates and sometimes rare fruits. Nests in hollow holes on the ground or on cliffs.

8. *Myadestes ralloides* – Andean Solitaire. Size: 16.5 to 18 cm. Light brown upper body, head with short bill and gray crown. Gray sides of the face, and brown wings with gray band. Silver gray lower parts. Usually eats fruits while supplementing their diet with insects. It makes its nest in the form of cup on rocks.

9. *Myioborus miniatus* – Slate-throated Whitestart. Size: 13.5 cm. Dark gray upper part and head with slate gray neck. Brown crown. Yellow chest and ventral sides. Black tail with visibly white external feathers. Found in forested areas, borders and clearing. Very active, moving along branches showing a characteristic white-tail when in flight, looking for insects among the dead leaves and vegetation.

10. *Penelope montagnii* – Andean Guan. Size: 60 cm. The head is grayish with fine stripes and the back is light chestnut brown. Gray colored breast and light red legs. Feeds on fruits and cup-shaped nests on simple open structures over low vegetation.

11. *Colaptes rubiginosus* – Golden-olive Woodpecker. Size: 23 cm. Golden olive body, with red head, crown, cheek and neck in male. Female only the nape red, both sides of the head white. Gray steel forehead, dark brown and white barred throat, dark gray and light yellow barred chest and belly. Feed on insects, found in barks of trees and vines at different levels. Nests in the hollows of dead or live trees.

12. *Psarocolius atrovirens* – Dusky-green Oropendola. Size: Male 41 cm. Female 43 cm. Generally, green olive, turning cinnamon in the lower wings, its head, lighter in color than the body, greenish yellow bill, yellow tail dotted with olive green. Eats fruits and berries in the canopy of the forest. Nests in giant colonies.

13. *Thamnophilus caerulescens* – Variable Antshrike. Size: 14.5 cm. Male, black with white spots on the tail. Female, grayish with brown belly and black wings. Feeds on various invertebrates, insects and spiders that hunt in middle and upper levels of entangled vines, where its nest in the form of a cup.

14. *Tragodytes aedon* – Southern House Wren. Size: 11 to 12 cm. The sides of its head are mottled brown color and lighter listing. Finely and lightly barred brown upper part with darker wings and tail. Black barred wings and tail. Horn-colored legs. Eats spiders, insects and other invertebrates that are found in open areas. Open dome shaped nests in structures or in cavities.

15. *Vireo olivaceus* – Red-eyed Vireo. Size: 12 to 15 cm. Gray olivaceous body, throat, chest and white lower body, head with gray crown and superciliary line edged in black. Feeds on insects and fruit depending on the season.

COMMON BIRDS
AT INKATERRA
MACHU PICCHU
PUEBLO HOTEL



1 | *Aratinga mitrata*
Cotorra Mitrada
Mitre Parakeet



2 | *Basileuterus coronatus*
Reinita de Corona Rojiza
Russet-crowned Warbler




3 | *Rupornis magnirostris*
Gavilán Caminero
Roadside Hawk



4 | *Geotrygon frenata*
Paloma-Perdiz de Garganta Blanca
White-throated Quail-Dove



5 | *Henicorhina leucophrys*
Cucarachero Montés de Pecho Gris
Gray-breasted Wood-Wren



6 | *Merganetta armata*
Pato de los Torrentes
Torrent Duck



7 | *Momotus aequatorialis*
Relojero Andino
Andean Motmot



8 | *Myadestes raloides*
Solitario Andino
Andean Solitaire



9 | *Myioborus miniatus*
Candelita Garganta Plomiza
Slate-throated Redstart




10 | *Penelope montagnii*
Pava Andina
Andean Guan




11 | *Colaptes rubiginosus*
Carpintero Oliváceo
Golden-olive Woodpecker



12 | *Psarocolius atrovirens*
Oropéndola Verde Oscuro
Dusky-green Oropendola



13 | *Thamnophilus caeruleus*
Batará Variable
Variable Antshrike



14 | *Troglodytes aedon*
Cucarachero Común
House Wren



15 | *Vireo (olivaceous)*
Vireo de Ojo Rojo
Red-eyed Vireo