

BIRDS
AT THE INCA TRAIL
AT INKATERRA
MACHU PICCHU
PUEBLO HOTEL



1 | *Aeronautes andecolus*
Vencejo Andino
Andean Swift



2 | *Andigena hypoglaucha*
Tucán Andino de Pecho Gris
Gray breasted Mountain Toucan



3 | *Anisognathus igniventris*
Tangara de Montaña de Vientre Escarlata
Scarlet Bellied Mountain Tanager



4 | *Anisognathus lacrymosus*
Tangara de Montaña Lacrimosa
Lacrimose Mountain Tanager



5 | *Geranoaetus Polyosoma*
Aguilucho Variable
Variable Hawk



6 | *Circus cinereus*
Aguilucho Cenizo
Cinereus Harrier



7 | *Cissopis leverianus*
Tangara Urraca
Magpie Tanager



8 | *Cyanocorax yncas*
Urraca Verde
Green Jay



9 | *Falco sparverius cinnamominus*
Cernícalo Americano
American Kestrel



10 | *Iridosornis jelskii*
Tangara de Collar Dorado
Golden Collared Tanager



11 | *Nothoprocta pentlandii*
Perdiz Andina
Andean Tinamou



12 | *Phalcoboenus megalopterus*
Caracara Cordillerano
Mountain Caracara



13 | *Ramphocelus carbo*
Tangara de Pico Plateado
Silver beak Tanager



14 | *Streptoprocne zonaris*
Vencejo Collarblanco
White-collared Swift



15 | *Turdus chiguanco*
Zorral Chiguanco
Chiguanco Thrush



16 | *Turdus serranus*
Zozal Negro-Brilloso
Glossy black Thrush



17 | *Vultur gryphus*
Cóndor Andino
Andean Condor

AVES CAMINO INCA BIRDS OF THE INCA TRAIL

Aves del Camino Inca

1. *Aeronautes andecolus peruvianus* - Vencejo Andino. Tamaño: 14 cm. Es delgado, ventralmente blanco al igual que los lados del cuello y dorsalmente marrón. La cola está bifurcada y es marrón. Se alimenta de insectos que caza al vuelo. Anida en paredes rocosas construyendo nidos con barro.

2. *Andigena hypoglaucha* - Tucán Andino de Pecho Gris. Tamaño: 48 cm. Pico muy colorido de punta roja con base y extremo anterior amarillos con una banda negra cerca de su base. Cabeza negra y garganta, pecho y vientre azul grisáceo. Dorsalmente marrón oliváceo, alas azul verdosas y cola negra. Come frutos y anida en cavidades naturales de los árboles.

3. *Anisogathus igniventris* - Tangara de Montaña de Vientre Escarlata. Tamaño: 16 cm. Cabeza, garganta, pecho, espalda y alas negras. Vientre rojo, cabeza con mancha semicircular a triangular roja por detrás del oído. Rabadilla y alas con hombros azules. Come frutos y, ocasionalmente, insectos. Anida en estructuras abiertas con forma de taza.

4. *Anisognathus lacrymosus* - Tangara de Montaña Lacrimosa. Tamaño: 16 - 17 cm. Cabeza y nuca azulada, con mancha amarilla por detrás del ojo; espalda, alas y cola azulada mas claras, ventralmente amarillo.

5. *Geranoaetus polyosoma* - Aguilucho Variable. Tamaño: 50 - 53 cm. Macho con cabeza y espalda grises, ventralmente blanco y cola blanca con banda negra. La hembra es similar pero con la espalda rufa. Existen dos fases de coloración clara y oscura que se muestra en el cambio de plumaje hasta llegar a adultos. Come insectos y roedores. Anida en zonas rocosas.

6. *Circus cinereus* - Aguilucho Cenizo. Tamaño: 45 - 50 cm. Macho de color cenizo con dorso mas oscuro, pecho barreteado de blanco entremezclado con bandas rufas. Alas grises con puntas negras y cola gris barreteada de negro. Hembra marrón estriado hacia el pecho y barreteado de marrón y blanco. Se alimenta de pequeñas aves y roedores. Anida en zonas rocosas.

7. *Cissopis leverianus* - Tangara Urraca. Tamaño: 25 cm. Pico, cabeza, pecho y espalda superior negro lustroso, ojo amarillo, vientre blanco, y alas negras con plumas blancas. Se alimenta de frutos e insectos, anida en estructuras abiertas en forma de taza.

8. *Cynacorax yncas* - Urraca Verde. Tamaño: 28 - 30 cm. Región superior de la cabeza y cuello blanco azulado o azul con pluma erizadas en el pico. Dorso y alas color verde. Cola amarilla con centro verde. El pecho es amarillo brillante. Es un ave omnívora que hace nidos en los árboles en forma de canasta ovalada.

9. *Falco sparverius cinnamominus* - Cernicalo Americano. Tamaño: 25 cm. Macho con cabeza gris oscura, mejillas blancas con dos líneas oscuras y espalda canela barreteada de negro. Alas azul grisáceas acaneladas con puntos negros, cola acanelada con banda negra y puntas blancas, pecho y vientre blanco cremoso con puntos negros. Hembra con espalda, alas y cola canela con barras negras y vientre blanquecino con estrías canelas. Come insectos y vertebrados pequeños. Anida en rocas o cavidades de los árboles.

10. *Iridosornis jelskii* - Tangara de Collar Dorado. Tamaño: 14 cm. Cabeza, cara, garganta y nuca negras. Cuello de lados amarillos que se extiende y cubre completamente la corona a manera de gorra amarilla con tira a los costados. Espalda y alas azules, bordes externos del ala y cola negro, pecho y panza castaño claro. Come frutos, y ocasionalmente, insectos. Anida en estructuras abiertas en forma de taza.

11. *Nothoprocta pentlandii* - Perdiz Andina. Tamaño: 25 - 30 cm. Cabeza pequeña con manchas oscuras en la cotona y por detrás del ojo. Pico curvo y delgado, espalda con barras anchas acaneladas mezclada con bandas negras. Ventralmente acanelado, con bandas marrones grisáceas y con puntuaciones blanquecinas a la altura del pecho. Se alimenta de frutos y granos que encuentra en el suelo, anida abiertamente sobre el suelo.

12. *Phalcoboenus megalopterus* - Caracara Cordillerano. Tamaño: 52 cm. Coloración negro brillante, vientre, rabadilla y parche alar blancos, la cola es negra con una banda ancha blanca en la terminal. Generalmente se alimenta sobre el suelo donde busca pequeños invertebrados, anida en las cavidades en las rocas.

13. *Ramphocelus carbo* - Tangara de Pico Plateado. Tamaño: 18 cm. Coloración rojiza en el macho y marrón opaca en la hembra. Relativamente común y local en bosques húmedos montanos o las laderas de los Andes (1300-1700m.). Se alimenta de insectos.

14. *Streptoprocne zonaris* - Vencejo de Collar Blanco. Tamaño: 20 cm. Vencejo grande de color negro brillante con un prominente collar blanco que se hace más ancho hacia el pecho, la cola es bifurcada. Se alimenta de insectos que caza al vuelo. Anida en paredes rocosas construyendo nidos de barro.

15. *Turdus chiguanco* - Zorral Chiguanco. Tamaño: 27 - 28 cm. Dorsalmente gris oliváceo y ventralmente gris humo; pico y patas amarillas. Se alimenta de frutos y de insectos. Hace nidos de barro en árboles o paredes rocosas.

16. *Turdus serranus* - Zorral Negro-Brilliso. Tamaño: 23 - 25 cm. Macho negro lustroso, patas y pico anaranjadas, anillo ocular anaranjado. Hembra marrón, pico y patas amarillentas terrosas y un angosto anillo ocular de color naranja amarillento. Come frutos e insectos. Hace nidos de barro en árboles o paredes rocosas.

17. *Vultur gryphus* - Cóndor Andino. Tamaño: 1.20 mts y 3 mts con las alas desplegadas. El macho con la cabeza, cresta y cuello desnudos de color rosado carne, distintivo collar de plumones blanco. Ojos con iris marrón, cuerpo negro y alas con un gran parche blanco plateado. La hembra es similar pero no tiene cresta ni collar y su iris es rojo. Se alimenta de carroña, anida en cavidades salientes en paredes rocosas de difícil acceso.

Birds of Inca Trail

1. *Aeronautes andecolus peruvianus* - Andean Swift. Size: 14 cm. Thin, white front and sides of the neck and brown back. Brown, notched tail. Feeds on insects hunt in flight. Builds nests with mud in rocky walls.

2. *Andigena hypoglaucha* - Gray breasted Mountain Tanager. Size: 48 cm. Very colorful bill with red tip, with yellow base and inner part, black band around its base. Black head and throat, grayish blue breast and lower parts. Olivaceous brown upper parts, blue-green wings and black tail. Eats fruits and nest in natural cavities of trees.

3. *Anisogathus igniventris* - Scarlet Billied Mountain Tanager. Size: 16 cm. Black head, neck, breast, back and wings black. Red lower parts, head with red semicircular to triangular mark across behind the ear. Coccyx (Rabadilla) and wings with blue shoulders. Eat fruits and occasional insects. Cup-shaped nests in open structures.

4. *Anisognathus lacrymosus* - Lacrimose Mountain. Size: 16 to 17 cm. Blue head and neck, yellow spot behind the eye, light blue back, wings and tail, yellow lower parts.

5. *Geranoaetus polyosoma* - Variable Hawk. Size: 50 to 53 cm. Male, gray head and back, white under parts, white tail with a black band. Female, similar but with the rufous back. There are two phases coloring from light to dark which shows in the change of feathers until it reaches adulthood. Eats insects and rodents. Nests in rocky areas.

6. *Circus cinereus* - Cinereous Harrier. Size: 45 to 50 cm. Male, ash-colored with darker upper back, chest barred with white band mixed with rufous. Gray wings with black tips and gray and black barred tail. Female, brown striped to the chest and barred with brown and white. It feeds on small birds and rodents. Nests in rocky areas.

7. *Cissopis leverianus* - Maggie Tanager. Size: 25 cm. Glossy black bill, head, breast and upper back, yellow eyes, white belly and black wings with white feathers. It feeds on fruits and insects, nests in the form of a cup, on open structures.

8. *Cynacorax yncas* - Green Jay. Size: 28 to 30 cm. Bluish white or blue upper part of the head and neck, with plumage fraught at the peak. Green back and wings. Yellow tail with green in the middle. Bright yellow breast. Omnivorous bird that makes nests in the form of oval basket in trees.

9. *Falco sparverius cinnamominus* - American Kestrel. Size: 25 cm. Male, dark gray head, white cheeks with two dark lines, and cinnamon black barred back. Bluish gray wings lined with black dots, tail lined with black bars and white dots, creamy white breast and lower parts with black dots. Female, cinnamon-colored back, wings and tail barred in black, whitish lower parts with cinnamon stripes. Eat insects and small vertebrates. Nests in rocks or cavities of trees.

10. *Iridosornis jelskii* - Golden Collared Tanager. Size: 14 cm. Black head, face, throat and neck. Neck with yellow side that extends and fully cover the crown like a hat with yellow stripe down the sides. Blue back and wings, outer edges of the wing and black tail, light brown breast and belly. Eats fruits, occasionally, insects. Nests in open structures in the form of a cup.

11. *Nothoprocta pentlandii* - Andean Tinamou. Size: 25 to 30 cm. Small head with dark spots in the cotona and behind the eye. Beak curved and thin, back with bars wide mixed with black stripes. Lower parts, brown striped grey and white spots on the chest. It feeds on fruits and grains found on the ground, nests openly on the ground.

12. *Phalcoboenus megalopterus* - Mountain Caracara. Size: 52 cm. Shiny black color, black belly and upper tail, and white patched wings, tail is black with a broad white band at the ends. Usually feeds on the ground to look for small invertebrates, nest in the cavities of rocks.

13. *Ramphocelus carbo* - Silver beak Tanager. Size: 18 cm. Reddish brown color in male and lighter in female. Relatively common and local in montane rain forests or the slopes of the Andes (1300-1700m.). It feeds on insects.

14. *Streptoprocne zonaris* - White collared Swift. Size: 20 cm. Big swifts, glossy black with a prominent white collar which becomes wider towards the chest, tail is forked. Feeds on insects that hunt in flight. Nests in rocky walls made of mud.

15. *Turdus chiguanco* - Chiguanco Thrush. Size: 27 to 28 cm. Upper part grayish olive and smokey gray lower part, yellow bill and legs. Feeds on fruits and insects. Make nests in trees or rocky walls.

16. *Turdus serranus* - Glossy back Thrush. Size: 23 to 25 cm. Male glossy black, orange legs and bill, orange eye ring. Female brown, yellow bill and legs and a narrow yellowish orange earth-color eye ring. Eats fruits and insects. Makes mud nests in trees or rocky walls.

17. *Vultur gryphus* - Andean Condor. Size: 1.20 meters and 3 meters with spread wings. Male nude colored head, neck and crest, distinctive white collar with white plumage. Eyes with brown iris, black body and wings with a large silver white patch. The female is similar but does not have a white crest or neck, its iris red. Feeds on carrions, nests in cavities in outcropping rocky walls that are difficult to access.