

AVES DEL CLARO DEL BOSQUE BIRDS IN FOREST CLEARING

Aves del Claro del Bosque

1. *Amazona farinosa* – Loro Harinoso. Tamaño: 40 – 41 cm. Mayormente verde pálido. Pico oscuro, cabeza con pequeño parche amarillo en la corona y ojo rodeado de piel blanca. Parte posterior del cuello y espalda manchado de azulino, cola con dos tonos de amarillo la mitad proximal verde oscuro y la distal verde amarillento. Come semillas y frutos. Anida en cavidades de árboles.

2. *Ara ararauna* – Guacamayo Azul y Amarillo. Tamaño: 80 – 84 cm. Cabeza con corona y nuca azul y lados con una amplia área desnuda blanca que tiene líneas delgadas de plumas rojas. Cara blanca con un pico poderoso negro, dorsalmente azul y ventralmente amarillo naranja. Se alimenta de semillas, frutos, bayas. Anida en cavidades de árboles.

3. *Ara macao* – Guacamayo Escarlata. Tamaño: 85 – 90 cm. Mayormente rojo esкарлата, cabeza con los lados blancos y desnudos y pico poderosos con la mandíbula blanca y la maxila negra. Alas rojo esкарлатas y mancha amarilla dispuesta hacia la mitad y azulino hacia los extremos del ala. Se alimenta de semillas, frutos y bayas. Anida en cavidades de árboles.

4. *Aramides cajaneus* – Rascón Montés de Cuello Gris. Tamaño: 36 – 40 cm. Cabeza marrón grisácea y pico verde con la basa amarilla. Espalda marrón olivo, rabadilla, cloaca y cola negras. El pecho es canela, la panza negra y las patas rojas. Se alimenta de invertebrados y pequeños vertebrados que encuentra cerca del agua, anida en plataformas y estructuras a manera de taza cerca del suelo.

5. *Brotegeris cyanoptera* – Perico ala cobalto. Tamaño: 19 – 20 cm. Mayormente verde. Cabeza con frente amarillenta y alas con plumas cobertoras azul cobalto, se alimenta de semillas, frutos y bayas. Anida en cavidades de árboles y termiteros.

6. *Cacicus cela* – Pauca / Cacique de Lomo Amarillo. Tamaño: 27 – 28 cm. Pico verdusco mezclado con blanco pálido, cuerpo y cabeza negros e iris azul. Rabadilla, espalda baja y parte proximal de la cola amarillas. Ala con parte amarilla detrás del hombro. Come frutos y bayas en el dosel del bosque. Anida en colonias de nidos colgantes.

7. *Chaetura brachyura* – Vencejo de Cola Corta. Tamaño: 10 – 11 cm. Por encima es negro hollín que contrasta con la rabadilla y la parte dorsal de la cola gris ceniza, ventralmente marrón negrusco. La cola es muy corta en relación al cuerpo. Se alimenta de insectos que captura en el vuelo y anida en lugares inaccesibles, usualmente huecos de árboles o construyendo nidos a manera de taza con materiales pegados con saliva.

8. *Cyanocorax violaceus* – Urraca Violácea. Tamaño: 37 – 38 cm. Cabeza, garganta y pecho negro que contrasta con el color violáceo opaco del cuerpo. El cuello y nuca presentan un color blanco azulado. Es un ave oportunista que se alimenta de pequeños invertebrados, insectos, huevos y fruta. Anida en cavidades de árboles.

9. *Megarynchus pitangua* – Mosquero Picudo. Tamaño: 22 – 23 cm. Cabeza negra, corona armilla escondida, línea superficial blanca que se extiende hasta la nuca, pico largo, garganta blanca, pecho y panza amarillo, dorsalmente marrón olivo. Se alimenta de insectos y frutos. Anida en diferentes tipos de cavidades.

10. *Monasa nigrifrons* – Monja de frente negra. Tamaño: 28 – 29 cm. Cuerpo negro con pico notablemente rojo. Foragea en todos los niveles del bosque. Ausente en bosques de tierra firme. Se alimenta de insectos y anidan a nivel del suelo o bancos de los ríos.

11. *Myiarchus ferox* – Copetón de Cresta Corta. Tamaño: 18 – 19 cm. Cabeza marrón cenizo con cresta corta y pico negro. El cuello y el pecho son grises, panza amarillenta dorsalmente marrón grisáceo y las alas tiene cobertores grises y dos barras pálidas, se alimenta de insectos y anida en diferentes tipos de cavidades.

12. *Pianus menstruus* – Loro de Cabeza Azul. Tamaño: 25 – 27 cm. Cabeza, cuello y pecho azul, área alrededor del ojo desnuda y blanca y pico oscuro con base rosada. Parte anterior del cuello con manchas rojas y mancha negra a la altura del oído. Cobertoras de la cola roja. Se alimenta de semillas, frutos y bayas. Anida en las cavidades de los árboles.

13. *Psarocolius angustifrons* – Oropéndola de Dorso Bermejo. Tamaño: 45 – 47 cm. el macho y 36 – 38 la hembra. Ojo con iris azul claro, cabeza, cuello, pecho y vientre oliváceo, espalda alta olivácea, resto de la espalda y rabadilla castaños, alas oscuras, cola con plumas centrales amarillas y plumas externas oscuras. Se alimentan en el dosel del bosque de frutos y bayas, anidan en colonias de nidos colgantes, los que se ubican usualmente en árboles altos aislados y visibles.

14. *Tachornis squamata* – Vencejo Tijereta de Palmeras. Tamaño: 13.2 – 14 cm. Por encima marrón negrusco tenue y ventralmente blanquecino con motas oscuras. Cuello y parte media del cuerpo moteado de blanco y oscuro. Se alimenta de insectos que captura en el vuelo y anida en lugares inaccesibles, en las estructuras salientes de palmeras y en las brácteas y grandes hojas.

15. *Thamnophilus doliatus* – Batará Barrado. Tamaño: 15 – 16 cm. Especie de dimorfismo sexual. Macho con cabeza de gorrina negra, cresta de plumas y ojos amarillentos. Dorsalmente, espalda, alas y cola blancas barreteado de blanco y ventralmente blanco barreteado de negro. Hembra castaña con pecho y el vientre crema. Como invertebrados, insectos y arañas que caza a niveles medios y altos de la vegetación ribereña donde anida. Nidos abiertos, suspendidos cerca del suelo y con forma de taza.

16. *Turdus ignobilis* – Zorzal de Pico Negro. Tamaño: 23 – 25 cm. Dorsalmente marrón grisáceo oscuro, alas canelas, cola oscura y pico amarillo. Ventralmente marrón oliváceo, garganta blancuzca estriada de negro y panza blanca. Se alimentan de frutos y de insectos, anida en árboles en nidos de barro.

17. *Tyrannus melancholicus* – Tirano Tropical. Tamaño: 20 – 22 cm. Cabeza gris. Parche naranja rojizo en la corona, cara algo mas oscura, garganta blanco grisáceo, pecho olivado y vientre amarillo encendido, dorsalmente gris con tintes de olivo. Las alas son oscuras con plumas pálidas. Se alimenta de frutos e insectos que caza desde perchas. Nidos abiertos en las horquetas de las ramas

Birds in Forest Clearing

1- *Amazona farinosa* – Mealy Parrot. Size: 40 to 41 cm. Mostly light green. Dark bill, head with small yellow patch on the crown and eye surrounded by white skin. Bluish stains on back of the neck and back, two toned yellow tail, proximal half dark green and yellow green distal half. Eats seeds and fruits. Nests in tree cavities.

2. *Ara ararauna* – Blue-and-yellow Macaw. Size: 80 to 84 cm. Blue, head with crown and blue nape, sides with a nude white wide area with thin red lines of feathers. White face white a prominent black bill, blue upper part and yellow orange lower part. It feeds on seeds, fruits, berries. Nests in tree cavities.

3. *Ara macao* – Scarlet Macaw. Size: 85 to 90 cm. Mostly scarlet red, white head and sides and naked, prominent bill with white mandible and black maxilla. Scarlet red wings and yellow spot towards the middle and bluish toward the outer tail feathers. Feeds on seeds, fruits and berries. Nests in tree cavities.

4. *Aramides cajanea* – Gray-necked Wood-Rail. Size: 36 – 40 cm. Grayish brown head and green bill with a yellow bas. Olive brown back, tailbone, black sewer and tail. Cinnamon colored breast, black belly and red legs. Feeds on small invertebrates and vertebrates found near water, cup-shaped nests on habitats and structures near the ground.

5. *Brotegeris cyanoptera* – Cobalt-winged Parakee. Size: 19 to 20 cm. Mostly green. Yellow head and forehead, cobalt blue feathered wings. Feeds on seeds, fruits and berries. Nests in tree and termite cavities.

6. *Cacicus cela* – Yellow-rumped Cacique. Size: 27 to 28 cm. Greenish bill mixed with white, black body and head and blue iris. Yellow tailbone, lower back and proximal part of the tail. Partly yellow wings behind the shoulder. Eats fruits and berries in the forest canopy. Forages in colonies of hanging nests.

7. *Chaetura brachyura* – Short-tailed Swift. Size: 10 to 11 cm. Charcoal black on top which contrasts with ash gray tail bone and dorsal part of the tail, black brown lower part. The tail is very short in proportion to the body. Feeds on insects caught in flight and cup-shaped nests built with materials glued with saliva in inaccessible places, usually hollow trees.

8. *Cyanocorax violaceus* – Violaceous Jay. Size: 37 to 38 cm. Black head, neck and breast in contrast to light violet body. Bluish white neck and nape. Opportunistic bird that feeds on small invertebrates, insects, eggs and fruit. Nests in tree cavities.

9. *Megarynchus pitangua* – Boat-billed Flycatcher. Size: 22 to 23 cm. Black head, crown armilla hidden, white superficial extends up the nape, long bill, white throat, yellow breast and belly, olive brown upper part. Feeds on insects and fruit. Nests in various types of cavities.

10. *Monasa nigrifrons* – Black fronted nunbird. Size: 28 to 29 cm. Black body with notable red bill. Forages at all levels of the forest. Not found in inland. Feeds on insects, nests at ground level or banks of rivers.

11. *Myiarchus ferox* – Short-crested Flycatcher. Size: 18 to 19 cm. Ash brown head with short crest and black bill. Gray neck and breast, upper part brown, yellowish belly, brownish gray upper part, gray covered wings with two light bars. Feeds on insects and nest in different types of cavities.

12. *Pianus menstruus* – Blue-headed Parrot. Size: 25 to 27 cm. Blue head, neck and breast, naked area and white around the eye and white bill with pink base. Back part of the neck with red spots and black spots on the ears. Red tail coating. Feeds on seeds, fruits and berries. Nests in tree cavities.

13. *Psarocolius angustifrons* – Russet-backed Oropéndola. Size: 45 to 47 cm. Male 36 – 38 females. Eye with blue iris, Olivaceous head, neck, breast and belly. Upper back Olivaceous, the rest of the back and tailbone, chestnut. Dark wings, yellow central tail feathers and dark inner feathers. Feed in the forest canopy with fruits and berries, nest in colonies of hanging nests, isolated in visible, tall trees.

14. *Tachornis squamata* – Fork-tailed Palm swift. Size: 13.2 – 14 cm. Light blacking brown on top and lower part whitish with dark spots. Spotted white and dark neck and middle part of the body. Feeds on insects caught in flight and nest in inaccessible places, in the outcropping structures of palms, bracts and large leaves.

15. *Thamnophilus doliatus* – Barred Antshrike. Size: 15 to 16 cm. Sexual dimorphic species. Male, head with a black cap, feathery crest and yellowish eyes. White to white to black barred upper part, back, wings and tail, white lower part. Female, chestnut with cream breast and belly. Eat invertebrates, insects and spiders they hunt in mid and upper levels of vegetation where they nest. Cup-shaped open nests, suspended near the ground.

16. *Turdus ignobilis* – Black-billed Thrush. Size: 23 to 25 cm. Dark grayish brown upper part, cinnamon-colored wings, dark tail and yellow bill. Olivaceous brown lower part, whitish throat with black stripe, white belly. Feeds on fruits and insects, nests made of mud, in trees.

17. *Tyrannus melancholicus* – Tropical Kingbird. Size: 20 to 22 cm. Gray head. Reddish orange patch in the crown, face somewhat darker, grayish white neck, olive breast and bright yellow belly, gray upper part with shades of olive. Dark wings, light feathers. Feeds on fruits and insects by hanging from perches. Open nests in forks of branches.

BIRDS IN THE FOREST
CLEARING AT INKATERRA
RESERVA AMAZONICA


- 1 | *Amazona farinosa*
Loro Harinoso
Mealy Parrot




- 2 | *Ara ararauna*
Guacamayo Azul y Amarillo
Blue and yellow Macaw



- 3 | *Ara macao*
Guacamayo Escarlata
Scarlet Macaw



- 4 | *Aramides cajaneus*
Rascón Montes de cuello gris
Gray-necked Wood-Rail



- 5 | *Brotogeris cyanoptera*
Perico de Ala cobalto
Cobalt-winged Parakeet



- 6 | *Cacicus cela*
Paucau Cacique de lomo amarillo
Yellow-rumped Cacique



- 7 | *Chaetura brachyura*
Vencejo de Cola Corta
Short-tailed Swift



- 8 | *Cyanocorax violaceus*
Urraca violácea
Violaceous Jay




- 9 | *Megarhynchus pitangua*
Mosquero Picudo
Boat-billed Flycatcher



- 10 | *Monosa nigrifrons*
Monja de frente negra
Black-fronted Nunbird

- 12 | *Pionus menstruus*
Loro de Cabeza Azul
Blue-headed Parrot



- Psarocolius angustifrons*
Oropéndola Dorsibermejo
Russet-backed Oropendola

- 11 | *Myarchus Ferox*
Copetón de Cresta Corta
Short-Crested Flycatcher




- 13 | *Psarocolius angustifrons*
Oropéndola de Dorso Bermejo
Russet-backed Oropendola



- 14 | *Tachornis squamata*
Vencejo Tijereta de Palmeras
Fork-tailed Palm Swift

- 16 | *Turdus Ignobilis*
Zorzal de Pico Negro
Black-billed thrush



♀



- 15 | *Thamnophilus doliatus*
Batará Barrado
Barred Antshrike



♂



- 17 | *Tyrannus melancholicus*
Tirano Tropical
Tropical Kingbird