

AVES DENTRO DEL BOSQUE BIRDS IN THE FOREST

Aves Dentro del Bosque

1. *(Ibycter) americanus* - Caracara de Vientre Blanco. Tamaño: 48 - 56 cm. Generalmente negro con la panza y cola ventralmente blancas. Garganta y cara con un parche de piel desnuda y patas rojas. Se alimenta básicamente de huevos, frutos, larvas de abejas, y avispas. Anida en grupos dentro de cavidades.
2. *Dendrexetastes rufigula* - Trepador de Garganta Canela. Tamaño: 24 - 25 cm. Pico largo y fuerte de color amarillo verdusco pálido, iris rojo y de coloración general marrón. Garganta canela y líneas blancas de borde negro dispuestas en el pecho. Come insectos y frutos que busca en los árboles. Anda en cavidades bajas.
3. *Electron platyrhynchum* - Relojero de Pico Ancho. Tamaño: 33 - 35 cm. Cabeza, cuello y pecho rufus, pico negro, grueso y largo. Mascara negra que cubre los ojos y pecho con dos manchas semicirculares negras. Dorsalmente verde con cola azul verdusca y negra que termina a manera de raqueta. Barbilla, panza y cobertoras de la cola azul verdosas. Come insectos grandes y en ocasiones vertebrados pequeños. Anida en huecos sobre el suelo o riscos.
4. *Formicarius analis* - Gallito-hormiguero de Cara Negra. Tamaño: 18 - 19 cm. Dorsalmente marrón con tonos rufo en las alas y rabadilla. Cola, cara y garganta negra, ojo rodeado de piel azulina. Pecho gris panza gris pálido. Come insectos que busca sobre el suelo revolviendo las hojas secas, esporádicamente sigue hordas de hormigas soldado. Hace nidos de hojas en forma de taza en cavidades.
5. *Momotus momota* - Relojero amazónico. Tamaño: 39 - 43 cm. Frente azul turquesa que se extiende hacia la nuca y rodea la corona negra. Cara con máscara negra que cubre al ojo rojo. Garganta, pecho y panza verde claro y alas con bordes externos azules. Cola larga azul verdosa que termina en forma de raqueta. Come insectos grandes y en ocasiones vertebrados pequeños. Anida en huecos sobre el suelo o riscos.
6. *Myrmoborus leucophrys* - Hormiguero de Ceja Blanca. Tamaño: 13.5 - 14 cm. Macho gris oscuro, cabeza con ceja blanca que se extiende desde la frente a la nuca, cara y garganta negras. Hembra dorsalmente marrón, cabeza con máscara negra que cubre el ojo y ceja ancha color canela. Come insectos que busca desde el suelo hasta casi cuatro metros de altura, esporádicamente sigue hordas de hormigas soldado. Anida en estructuras en forma de taza en la vegetación baja.
7. *Nyctidromus albigollis* - Chotacabras Común. Tamaño: 28 - 30 cm. Cabeza con corona gris y manchas negras, cara castaña y cuello blanco en forma de semicollar. Dorsalmente marrón gris con manchas largas negras y pequeñas cremas, oscuras y canela en las ala. Ventralmente marrón ocre. En el macho la cola tiene plumas marrones y blancas y en la hembra barras oscuras y blancas. Come insectos medianos y grandes. Anida en el suelo, en especial en zonas abiertas o poca vegetación cerca del río.
8. *Ortalis guttata* - Chachalaca Jaspeada. Tamaño: 50 - 53 cm. Cabeza, cuello y pecho marrón con plumas con terminaciones blancas en apariencia jaspeada. Dorsalmente marrón olivo oscuro, rabadilla acanelada y cola bronceada. Se alimenta de frutos y anda en estructuras simples y abiertas en la vegetación de bajo tamaño.
9. *Patagioenas cayennensis* - Palom Colorado. Tamaño: 28 - 30 cm. Apariencia colorada con cabeza y nuca marcadamente gris. garganta, panza y cola grises, rabadilla azul grisáceo, pecho rojo vino, espelda y alas castaño violeta. Se alimenta de frutas y semillas además de ser las únicas aves que toman directamente agua. Anida sobre ramas débiles.
10. *Piaya cayana* - Cuco Ardilla. Tamaño: 43 - 45 cm. Dorsalmente castaño, pico y anillo ocular verdusco pálido, vientre negro con la parte alta del pecho gris y la mas baja clara. Cuello rosado y cola larga castaño oscura con manchas blancas. Come insectos y larvas de mariposas y polillas. Construye su nido en las horquetas de las ramas de árboles y arbustos.
11. *Pulsatrix perspicillata* - Buho de Anteojos. Tamaño: 45 - 46 cm. Cabeza y espalda marrón chocolate, ojos amarillos con cejas que llegan debajo del ojo y garganta blanca. La parte alta del pecho es marrón y la baja y la panza crema ocrácea. Cola y alas marrón oscuras con barras claras. Se alimenta de mamíferos pequeños e insectos de mediano tamaño a grande. Anida en cavidades de árboles.
12. *Ramphastos tucanus* - Tucán de Garganta Blanca. Tamaño: 53 - 57 cm. Pico largo de 18 - 21 cm. y pico negro con tonos azul y punta amarilla. Cuerpo negro con rabadilla amarilla y cobertoras de la cola rojo, garganta y pecho blancos con una delgada línea roja que los separa de la panza. Se alimenta casi exclusivamente de frutos y anida en cavidades naturales de los árboles.
13. *Trogon melanurus* - Trogón de Cola Negra. Tamaño: 30 - 32 cm. Macho con cara y garganta alta negras, pico amarillo y anillo alrededor del ojo rojo. Pecho, corona, nuca y espalda azul verdoso brillante. Alas con muy finas y densas barras blanco y negro, ventralmente la cola es negra, pecho delimitado por una delgada línea blanca y panza roja. Hembra gris en garganta, pecho y dorso, panza de color rojo, pico con mandíbula manchada de negro y con base amarilla. Come frutas e insectos. Anida en cavidades naturales de los troncos y termiteros.
14. *Trogon caligatus* - Trogón de Ligero. Tamaño: 22.5 - 23 cm. Anillo orbital amarillo, cola barreada y partes delanteras azules. La hembra tiene los anillos orbitales "rotos" de color blancos y sus partes delanteras son grises. La cola en las hembras tiene un barreado más fino que el de las hembras de los trogones coliblanco. Se alimenta de pequeños insectos y fruta. Su pico ancho y patas débiles son un indicador de su alimentación. Anida en nidos de hormigas y avispas.
15. *Trogon viridis* - Trogón de Dorso Verde. Tamaño: 28 - 29 cm. Macho azul brillante en pecho, corona y espalda con cara negra a modo de máscara. Pico azul grisáceo y anillo celeste alrededor del ojo, panza amarillo-anaranjada, cola negra con manchas terminales blancas. Hembra con cabeza, pecho y espalda grises, alas oscuras con finas barras blanco y negro, cola negra con manchas terminales blancas y barreado de blanco. Come frutos e insectos. Anida en huecos de los troncos y termiteros.
16. *Xiphorhynchus guttatus* - Trepador de Garganta Anteada. Tamaño: 25 - 26 cm. Pico largo gris oscuro, maxila pálida y cuerpo dorsalmente marrón haciéndose mas oscuro hacia la corona y la nuca. Estrías crema en el pecho y espalda. Alas y cola canela rojizas y vientre castaño. Come insectos que busca en los árboles y esporádicamente sigue hordas de hormigas soldado. Anida en cavidades de árboles.

Bird in the Forest

1. *(Ibycter) americanus* - Red-throated Caracara. Size: 48 -56 cm. Generally black with white belly and lower tail. Throat and face with a patch of bare skin, red legs. Feeds primarily on eggs, fruits, larvae of bees, and wasps. Nests in groups within cavities.
2. *Dendrexetastes rufigula* - Cinnamon-throated Woodcreeper. Size: 24 to 25 cm. Light yellow green long and strong bill, red iris and generally brown color. Cinnamon throat and white lines edged in black arranged in the breast. Eats fruits and insects found in trees. Forage in low cavities.
3. *Electron platyrhynchum* - Broad-billed Motmot. Size: 33 to 35 cm. Rufous head, neck and breast, thick and long black bill. Black mask that covers the eyes and chest with two semicircular black spots. Green upper part, greenish blue tail with a racket-like tip. Greenish blue beard, belly and tail coatings. Eats large insects and sometimes small vertebrates. Nests in holes on the ground or in cliffs.
4. *Formicarius analis* - Black-faced Antthrush. Size: 18 to 19 cm. Brown upper parts with Rufous tones on the wings and tailbone. Black tail, face and neck, eye ringed with bluish skin. Gray breast, light gray belly. Eats insects while stirring dried leaves on the ground, sporadically following hordes of ants. Cup-shaped nests made of leaves in cavities.
5. *Momotus momota* - Amazonian Motmot. Size: 39 to 43 cm. Turquoise forehead that extends to the nape and around the black crown. Face with black mask covering the red eye. Light green throat, breast and belly and blue outer-edged wings. Greenish blue long tail with a tip in the form of racket. Eats large insects and sometimes small vertebrates. Nests in holes on the ground or in cliffs.
6. *Myrmoborus leucophrys* - White-browed Antbird. Size: 13.5 - 14 cm. Male, dark gray, head with white eyebrow which extends from the forehead to the neck, black face and throat. Female, upper part brown, head with black mask covering the eye and wide cinnamon color eyebrow. Eats insects from the ground to almost four meters high, following sporadically hordes of ants. Cup-shaped nests in structures at low vegetation.
7. *Nyctidromus albigollis* - Common Pauraque. Size: 28 to 30 cm. Gray head with crown and black spots, chestnut face and white neck in form collar. Grey brown upper part with long black spots and small cream spots, dark cinnamon color wings. Brown ochre lower part. Male tail feathers are brown and white; dark and white bars in female. Eat medium and large insects. Feeds on the ground, especially in open areas or little vegetation, near cold area.
8. *Ortalis guttata* - Speckled Chachalaca. Size: 50 to 53 cm. Brown head, neck and breast with feathers with white variegated edges. Dark olive brown upper part, tanned cinnamon tail bone and tail. Feeds on fruits and flies around open low vegetation and open structures.
9. *Patagioenas cayennensis* - Pale-vented Pigeon. Size: 28 to 30 cm. Colorful appearance, prominently gray head and neck gray. Gray throat, belly and tail, grayish blue tailbone, red wine-colored breast, violet brown back and wings. Feeds on fruits and seeds in addition being unique birds that drink water directly. Nests on weak branches.
10. *Piaya cayana* - Squirrel Cuckoo. Size: 43 to 45 cm. Chestnut upper part, light greenish bill and eye ring, black belly with gray upper breast gray and lighter lowest breast. Pink neck, long, dark brown tail with white spots. Eats insects and larvae of butterflies and moths. Builds its nest in the forks for tree branches and shrubs.
11. *Pulsatrix perspicillata* - Spectacled Owl. Size: 45 to 46 cm. Chocolate brown head and back, yellow eyes with eyebrows that reach below the eye, white throat. Brown upper breast, ochre cream lower breast and belly. Dark brown tail and wings light bars. Feeds on small mammals and medium to large insects. Nests in tree cavities.
12. *Ramphastos tucanus* - White-throated Toucan. Size: 53 to 57 cm. Long bill from 18 to 21 cm., black with shades of light blue, light yellow tip. Black body and tailbone with yellow and red coat on tail, white throat and breast with a thin red line that separates it from the belly. Feeds almost exclusively on fruit and nest in natural tree cavities.
13. *Trogon melanurus* - Black-tailed Trogon. Size: 30 to 32 cm. Male, black face and high throat, yellow bill and eye ring around red eye. Bright blue green breast, crown, nape and back. Finely barred and dense black and white wings, black lower tail, breast is bounded by a thin white line, red belly. Female, gray neck, chest and back, red belly, bill with black stained, yellow base jaw. Eat fruits and insects. Nests in natural cavities of trunks and termite.
14. *Trogon caligatus* - Gartered Trogon. Size: 22.5 to 23 cm. Yellow orbital ring, barred tail with blue front sides. Female has white "broken" orbital ring and gray front sides. The tail in females has a thinner bars than that of White-tailed Trogon. Feeds on small insects and fruit, its bill width and weak legs are indicators of its food. Nests in burrows of ants and wasps.
15. *Trogon viridis* - Green-Backed Trogon. Size: 28 to 29 cm. Male, brilliant blue breast, crown and back, black mask-like face. Greyish blue bill and blue eye ring, yellow-orange belly, black tail with white spotted edge. Female, gray head, breast and back, dark wings with fine black and white bars, black tail with white barred edge. Eat fruits and insects. Nests in holes of trunks and termite mounds.
16. *Xiphorhynchus guttatus* - Buff-throated Woodcreeper. Size: 25 to 26 cm. Long, dark gray bill, light maxilla, and light brown upper body, darker towards crown and nape. Cream stripes on the breast and back. Reddish cinnamon wings and tail, chestnut brown belly. Eats insects on trees and follows sporadically ant hordes. Nests in tree cavities.

BIRDS IN THE
FOREST OF INKATERRA
RESERVA AMAZONICA

